

## Météo

Chaleurs, orages  
et grêle

## Mildiou

Taches d'huile et  
mosaïque

## Oïdium

Absence

## Botrytis

Conditions  
favorables

## Cicadelle verte

Attaques  
ponctuelles

## Phénologie

Les vignes sont au stade maturité.  
Les détails du 2<sup>ème</sup> contrôle de  
maturité sont disponibles sur le site  
du CIVA.  
Le 3<sup>ème</sup> contrôle sera réalisé mardi 30  
août.

## Météo

Le mois de juillet et la première  
quinzaine du mois d'août auront  
apporté beaucoup d'eau : 92 à  
173 mm en cumul selon les postes.  
La grande majorité des stations a  
bénéficié d'environ 110 mm.  
Au cours des 10 derniers jours, le  
thermomètre a fortement chauffé,  
puisque les maximales ont dépassé  
les 35°C. Les pluies enregistrées au  
cours de cette période sont  
orageuses et ont été accompagnées  
localement de grêle (24/08). Les  
communes concernées se situent  
autour d'Obernai (Goxwiller,  
Bernardswiller, Barr...).

## Votre avis compte !

Enquête de satisfaction du BSV destinée aux lecteurs du BSV. Merci  
d'avance à ceux qui voudront bien consacrer deux petites minutes de  
leur temps à remplir ce questionnaire en ligne. Nous avons besoin de  
votre avis ! Cliquez ici :

<http://www.bas-rhin.chambagri.fr/questionnaires/bsvviti.htm>

Les grêlons ont atteint la taille de  
balles de ping-pong. Ces grappes  
éventrées devront être récoltées  
rapidement pour éviter tout risque de  
développement de pourriture acétique.



*Gewurtraminer touché par la grêle le 24/08 à  
Bernardswiller*

## Mildiou

Arès avoir été le grand absent de la saison 2011, le mildiou a fait son apparition tardive. En effet, les pluies répétées des mois de juillet et d'août ont engendré son installation sur le haut de feuillage et sur les entre-cœurs.



*Taches de mildiou sur le haut de feuillage 25/08*

Les parcelles les plus touchées sont défoliées sur le haut des pousses. Les grappes ne portent aucune trace du mildiou.

## Oïdium

Les vendanges ne seront pas altérées par l'oïdium, sauf exception (parcelles très humides, proximité de forêt, défaut de protection d'encadrement de fleur...).

## Botrytis

Les pinots sont les plus touchés par le développement du Botrytis. Il a profité des pluies puis de la chaleur. Les baies ont gonflé rapidement sous l'effet de ces pluies successives, créant des microfissures et des écrasements.

Les foyers les plus importants se rencontrent sur le pinot gris.

D'ores et déjà on observe des larves et des adultes de drosophiles, vecteurs de la pourriture acétique.



*Foyer de Botrytis sur pinot gris 25/08*

## Cicadelle verte

Les cicadelles vertes piquent les feuilles et se nourrissent de sève. Leurs piqûres engendrent des décolorations en bord de limbe. La photo ci-dessous présente le cas de figure extrême et les nécroses périphériques.



*Symptôme d'attaque de cicadelle verte*

*Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.*