

Météorologie et phénologie

6-8 feuilles

Tordeuses

Faible pression

Mildiou

Nouvelles taches
rares au 22 mai

Oïdium

7-8 feuilles : début
de sensibilité

Botrytis

Taches sur feuilles

Météorologie et Phénologie

Le mois de mai avance dans la fraîcheur. Les gelées ont été évitées mais les moyennes journalières montrent bien à quel point les températures sont faibles. Elles n'ont pas excédé les 11°C jusqu'à dimanche inclus.

Les pluies accompagnent cette morosité puisqu'au cours des 27 jours écoulés de ce mois, environ 20 jours ont été arrosés.

Les prévisions des jours à venir ne sont pas plus optimistes, puisque le retour à la pluie est annoncé après ces 2 journées ensoleillées de lundi et mardi.

En moyenne, on dénombre 6 à 8 feuilles étalés soit environ une feuille de plus depuis la semaine dernière.

Tordeuses

Situation

La situation n'évolue pas depuis le

précédent bulletin. Les captures sont peu nombreuses, voire nulles en raison des journées froides et humides. Les rares prises coïncident avec les jours ensoleillés.

Le calme se confirme aussi pour l'activité de ponte puisqu'au maximum 3 pontes sur 25 inflorescences sont notées. Il s'agit majoritairement d'œufs de cochylis. Le froid n'a pas permis de voir éclore ces pontes. Il est prématuré d'observer des glomérules.

Analyse du risque

La nuisibilité de ce ravageur n'est qu'indirecte. Potentiellement, il peut affecter le volume de récolte par la formation de glomérules. Aucune situation de ce mois de mai ne laisse à penser que le seuil théorique de 30 glomérules pour 100 grappes pourrait être atteint. La pression de ravageur est jugée faible.

Mildiou

Situation

De nouvelles taches ont été confirmées mercredi dernier pour les

communes de Ribeauvillé et Scherwiller et ce week-end à Wissembourg.



Tache sur pampre Ribeauvillé 22/05

Le mildiou a besoin de chaleur pour qu'il y ait contaminations et/ou repiquage. Avec des températures moyennes de l'ordre de 10-11°C, le risque est faible.

Les observations se concentrent sur les pampres et les parcelles sensibles et confirment la faible pression à cette date.

Analyse du risque

Les températures ont limité les contaminations et freinent la croissance de la végétation. Le risque sera lié à la hausse de températures si elles s'accompagnent de précipitations.

Oïdium

Situation

Aucun symptôme précoce n'est observé au sein du réseau.

Analyse du risque

Les parcelles les plus sensibles entrent dans la période de sensibilité (7-8 feuilles étalées). Pour la grande majorité des parcelles, la période à protéger se borne du stade boutons floraux séparés à la fermeture de la grappe.

Botrytis

Situation

Les précipitations régulières sont propices aux symptômes de botrytis sur feuilles identifiés depuis la semaine dernière.

Ce sont des taches brunes de forme plutôt triangulaire en bord de feuille. Un feutrage grisâtre apparaît en face inférieure.



Tache en bordure de feuille

Analyse du risque

Les attaques printanières sont sans lien avec le botrytis sur grappe. Elles sont la preuve visuelle que le mois de mai aura été très humide.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.