

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Bulletin n° 9 du 23 février 2010



A retenir cette semaine

- Les colzas ont redémarré
- Pensez à mettre en place les cuvettes
- Captures de charançons possibles dans les zones abritées



Prévisions météorologiques du 24 février au 01 mars :

Semaine très agitée avec régulièrement des vents à 30km/h en moyenne. Temps très variable avec des températures minimales oscillant entre 2 et 7°C et des maximales voisines de 10-12°C. Un épisode pluvieux est annoncé à partir de dimanche.

Réseau 2009-2010


Le réseau pour les observations de printemps est actuellement constitué de 65 parcelles. La fin des épisodes climatiques de froid et de neige permet de réactiver les observations pour la réalisation de ce bulletin. 7 parcelles ont fait l'objet d'un relevé d'observation cette semaine.

Stade des colzas

Les colzas sont en reprise de végétation avec l'apparition de nouvelles feuilles (stade C1). Quelques plantes dans des parcelles sont signalées à C2 (étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles – entre-nœuds visibles).

Mise en place des cuvettes

Une cuvette jaune est indispensable pour repérer l'arrivée des insectes dans le colza et surtout le charançon de la tige.



- Placer la cuvette à au moins 10 mètres au-delà de la bordure de la parcelle et si possible à proximité d'un ancien champ de colza de l'année précédente.
- Remplir les cuvettes avec environ 1 litre d'eau additionnée de quelques gouttes de mouillant (type liquide vaisselle par exemple).
- Le fond de la cuvette suit le niveau supérieur de la végétation.
- Réaliser 1 relevé au moins 1 fois par semaine.

Le charançon de la tige du colza est le premier insecte nuisible qui va être piégé. Attention à ne pas confondre ce dernier avec une autre espèce : le charançon de la tige du chou.



Seul le charançon de la tige du colza est fortement nuisible en raison des déformations occasionnées par le dépôt de ses œufs dans les tiges. Les deux espèces arrivent quasiment ensemble dans les pièges. Le charançon de la tige du colza se distingue par une taille plus grande et surtout par l'extrémité noire des pattes (rousses pour le charançon de la tige du chou).

	
Charançon de la tige du colza – extrémité des pattes noires	Charançon de la tige du chou – extrémité des pattes rousses

Vous pouvez consulter proplantExpert, un outil d'anticipation sur l'arrivée des insectes grâce aux données météorologiques prévisionnelles de 4 postes (Auxerre, Longvic, Mâcon et Nevers). La consultation des données proplantExpert ne doit pas se substituer à l'observation concrète des parcelles mais alerter sur l'arrivée potentielle du ravageur et inciter à la mise en place ou au suivi précis des cuvettes jaunes.

Ce service gratuit est disponible sur le site du CETIOM (www.cetiom.fr). Ci-après le lien direct : <http://www.cetiom.fr/index.php?id=7288>

La consultation de cet outil le 23 février montre l'absence de conditions climatiques favorables au vol de charançon sur la région dans les jours qui suivent.

