



Animateur référent

Marie-Laure BLANC
FREDON BN
02.31.46.96.53
ml.blanc.fredonbn@wanadoo.fr

Animateur suppléant

Marielle SUIRE
CA 76
02.35.59.47.50
marielle.suire@seine-maritime.
chambagri.fr

Directeur de la publication

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre
régionale d'agriculture de
Normandie

BSV consultable sur les sites
des DRAAF, des Chambres
d'agriculture

Abonnez-vous sur
www.normandie.chambagri.fr

Action pilotée par le ministère chargé
de l'agriculture, avec l'appui financier
de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions
diffuses attribués au financement du
plan Ecophyto.



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORMANDIE

ÉCOPHYTO

RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

L'essentiel de la semaine

Poireau : thrips : les captures restent faibles. Rouille en légère progression à Surtainville.

Chou : pucerons cendrés, sclérotinia, taches noires.

Carotte/céleri : mouche de la carotte : les captures sont en hausse ou stables sur tous les secteurs.

SOMMAIRE :

POIREAU	1
CHOU	2
CELERI-CAROTTE	3

POIREAU :

Suivi : Mont Saint Michel : 4 parcelles, stade : 12 feuilles à proche récolte.


Créances : 6 parcelles dont 1 en AB, stade : 12 feuilles à proche récolte.

Val de Saire : 3 parcelles.

Surtainville : 2 parcelles.

Rouille :

- Au Mont Saint Michel : aucune trace de la maladie n'a été observée.
- Créances : la rouille est stable dans les 3 parcelles atteintes. Les pustules sont sèches.
- Dans le Val de Saire : il n'y a pas d'évolution de la maladie.
- A Surtainville : La maladie progresse légèrement dans 2 parcelles (de 12% à 16% des poireaux sont atteints par la maladie).

Evolution du risque :  cette maladie est favorisée par un temps doux et humide.

Taches blanches (*Stemphylium sp.*, ...) :

Comme la semaine dernière, des taches blanches sont observées dans 2 parcelles de Créances (de 4% à 40% des plants présentent des taches sur leurs feuilles). De nouvelles taches blanches sont apparues dans une parcelle du Mont Saint Michel sur 4% des poireaux.


Evolution du risque : évolution à suivre.

Thrips :

Observation des plants :

L'eau présente sur les feuilles et à l'intérieur des fûts n'a pas permis l'observation des populations de thrips.

Piégeage chromatique :



Les captures de thrips restent faibles sur l'ensemble des secteurs observés.

Evolution du risque : malgré la pluie, les températures annoncées dans les prochains jours sont toujours favorables à l'activité des thrips notamment dans les parcelles ayant des populations installées.

CHOU :

Suivi : Val de Saire : 3 parcelles.

Surtainville : 1 parcelle.

Noctuelle défoliatrice/Teigne/Piéride :

Observation des plants :

Depuis plusieurs semaines, aucune chenille n'a été observée sur les parcelles du réseau.

Evolution du risque : le risque est faible. Surveillez néanmoins vos parcelles.


Puceron :

Quelques pucerons cendrés sont présents sur 8% des choux dans la parcelle observée à Surtainville.

Evolution du risque : à surveiller par temps sec et ensoleillé. Les foyers de pucerons cendrés peuvent affaiblir les jeunes plants et être présents sur ou à l'intérieur des pommes lors de la récolte.


Taches noires :

La maladie n'a pas évolué cette semaine dans les parcelles du réseau.

Evolution du risque :  cette maladie se développe en conditions humides.

Sclérotinia :

Comme la semaine dernière, il n'y a pas d'évolution de la maladie dans le Val de Saire.


Evolution du risque :  cette maladie est favorisée par un temps pluvieux et des températures comprises entre 18 et 25°C. Evitez les précédents sensibles tels que le céleri rave, la phacélie, la laitue.

CAROTTE - CELERI :

Mouche de la carotte :

- Val de Saire : 4 parcelles de carotte.


Evolution des captures de mouche de la carotte
Val de Saire - 2013



Les captures se maintiennent en parcelle de carotte.

- Surtainville : 4 parcelles de carotte dont 2 en AB.


Evolution des captures de mouche de la carotte
Surtainville - 2013



Comme dans le Val de Saire, les captures sont stables.

- Créances : 7 parcelles de carotte.

Evolution des captures de mouche de la carotte
Créances - 2013



Les captures de mouches de la carotte sont de nouveau en hausse à Créances.

