

Réseau 2015

Evolution

Météo et phénologie

Débourrement en
cours

Tordeuses

Mise en place des
capsules de
piégeage et de la
confusion sexuelle.

Excoriose

Période de sensibilité

Mange

bourgeons

Les boarmies et
noctuelles s'activent

Rais'Alsace

Nouvelle saison
début mai

Réseau 2015

Une nouvelle campagne débute, la 7^{ème} déjà pour le BSV viticulture.

Le réseau de partenaires évolue cette année. En effet, la cave de Kientzheim-Kaysersberg se retire suite à la fusion avec Bestheim en janvier.

Mais le réseau s'agrandit avec l'arrivée de parcelles fixes suivies par l'IFV et l'entrée d'un nouveau partenaire, la Maison Hauller à Dambach-la-ville.

Le réseau se compose à présent de **18 partenaires** :

AB2F, Alsace Appro, CAC Ampelys, Armbruster Vigne SARL, la Cave de Beblenheim, Bestheim&Châteaux, les Caves de Traenheim et Turckheim, la Coopérative d'Approvisionnement du Piémont, EURL MARCK, la Maison Hauller, l'IFV, le Labo Gresser, Viti Best, Viti.com, Wolfberger.

La FREDON Alsace et la Chambre d'agriculture de région Alsace sont partenaires et coanimateurs du réseau.

64 parcelles ont fait l'objet de

notations en 2014.

Les premières notations débuteront début mai. Rappelons qu'elles concernent en priorité les vers de la grappe, le mildiou, l'oïdium et le botrytis. Les partenaires se sont engagés à faire du suivi par piégeage de drosophiles.

Point météo et phénologie

L'hiver n'a pas été particulièrement rude avec environ 15 jours de gel (température moyenne journalière négative). La période la plus « froide » a été enregistrée entre Noël et nouvel an. Au plus bas la température journalière se situait entre -4 et -6°C.

La fin de l'hiver et amorce du printemps ont bénéficié de plus de précipitations que l'an dernier avec un cumul de l'ordre de 35 à 90 mm pour le mois de mars et la première quinzaine d'avril (pour mémoire 3 à 11 mm en 2014).

La douceur d'après Pâques, a donné un coup de fouet à la végétation. Le

débourrement est en cours et situe 2015 dans la moyenne.

Actuellement on note les stades « bourgeon dans le coton », à « éclatement » (photo ci-dessous). Le développement est très rapide.



La date moyenne de débourrement se situe au 15/04.

Tordeuses

Piégeage

Les pièges eudémis/cochylis/eulia peuvent être installés dès à présent. Les températures douces de la semaine devraient activer le début des prises.

Confusion sexuelle

Les diffuseurs doivent être positionnés avant le début des vols. Par conséquent, il est urgent de prévoir leur installation.

Excoriose

Situation

Les printemps 2012 et 2013 avaient été très favorables à l'excoriose (débourrement en conditions humides). Les conditions de 2014, très sèches ont elles limité les contaminations. Les symptômes (caractérisés par des nécrose brunes en plaque de chocolat, à la base des rameaux) sont, par conséquent, moins fréquents dans le vignoble pour ce printemps.

Analyse du risque

L'éclatement est le stade le plus sensible vis-à-vis de cette maladie. Le risque de contamination est plus faible en absence de précipitations à ce stade et de part la présence faible de symptômes de l'année précédente.

Les mange bourgeons

Situation

Dès le gonflement des bourgeons, le risque d'attaque par les boarmies ou les noctuelles reprend.

Les boarmies évident les bourgeons en suivant les fils de palissages, tandis que les noctuelles s'alimentent en premier lieu des bourgeons du courson et des premiers yeux des baguettes. De mœurs nocturnes, ces dernières vont remonter chaque nuit le long du tronc et détruire tous les bourgeons et les jeunes pousses à leur portée.

Les toutes premières noctuelles sont observées. Les boarmies sont elles actives et plusieurs bourgeons sont déjà évidés.

Analyse du risque

Actuellement, les dégâts observés à ce jour se situent à des niveaux inférieurs au seuil de 15% de ceps attaqués dans les parcelles historiquement sensibles.

Les boarmies cessent leur activité à l'éclatement des bourgeons, contrairement aux noctuelles qui poursuivent leurs prises alimentaires sur les premières feuilles étalées. La croissance rapide des bourgeons limite le risque de dégâts de boarmies.



Bourgeon évidé par une boarmie

Rais'Alsace : 5 au 7 mai : premières réunions

Les premières rencontres débiteront avec les entre le 5 et le 7 mai.

Le programme complet est joint à ce bulletin.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.