

Météo et phénologie

Eclatement à 2-3
feuilles étalées

Tordeuses

Début des vols

Mange bourgeons

Suivre les noctuelles

Mildiou

Stratégie

Pyrale

Premières larves

Rais'Alsace

Nouvelle saison
début mai

Météorologie et Phénologie

Les dernières précipitations datent de vendredi 17 avril après une douzaine de jours secs.

Ces pluies orageuses ont apporté entre 3 et 30 mm avec de forts écarts.

Le beau temps de la semaine ne devrait pas se maintenir. Le weekend est annoncé plus maussade et les jours suivants seront plus frais et humides.

Les parcelles les plus tardives sont au stade « éclatement ». En moyenne, on note « éclatement du bourgeon » à « 2-3 feuilles étalées ».

Tordeuses

Piègeage

Les premières prises d'eudémis et cochylys sont enregistrées depuis le milieu de semaine dernière.

Les mange bourgeons

Situation

L'éclatement des bourgeons marque la fin d'activité des boarmies.

Les noctuelles sont encore actives.

Les parcelles présentant des signes de mange-bourgeons ne sont que faiblement impactées (moins de 10% de ceps touchés).

Analyse du risque

La présence n'est effective que dans les parcelles historiquement sensibles. Le contrôle doit concerner ces parcelles sensibles aux noctuelles.

Mildiou

Analyse du risque

Rappelons les conditions nécessaires pour qu'il y ait une contamination :

- ✓ Œufs d'hiver murs
- ✓ Température supérieure à 11°C
- ✓ Précipitations sur sol humide
- ✓ Stade 1^{ère} feuille étalée atteint

Le suivi des œufs d'hiver a été entrepris à l'issue des vendanges et ce printemps sur 2 sites, Colmar et Obernai. Depuis la semaine dernière,

les œufs sont murs, c'est-à-dire qu'ils germent en moins de 24h.

La pluie du 17 avril est survenue à un stade encore un peu tôt (éclatement en moyenne) et surtout sur sol sec depuis plus de 10 jours. L'absence de pluie pour la semaine, limite le risque de contamination.

Au niveau des températures, les moyennes sont elles encore insuffisantes pour le mildiou.

La stratégie alsacienne repose sur le déclenchement de la lutte dès la détection de la toute première tache au vignoble. L'objectif est d'éviter tout repiquage à partir de ce premier cycle.

Les pluies du weekend à venir, et si toutes les conditions sont réunies, pourront enclencher le premier cycle. La surveillance du vignoble devra être active peu avant la sortie théorique de cette première tache.

Le prochain bulletin du 5 mai fera un état des lieux de la situation.

Pyrales

Situation

Les jeunes chenilles mesurent moins de 3-4mm maximum et sont blotties dans pousses les plus développées à l'heure actuelle. Leur présence est trahie par les déjections et de très légères morsures des feuilles.



Analyse du risque

Le seuil d'intervention pratiqué en Champagne est de 100% de ceps occupés par au moins une pyrale. Ce seuil n'est pas atteint, mais les parcelles très touchées depuis 2-3 ans doivent faire l'objet d'une surveillance.

Rais'Alsace : rappel, 5 au 7 mai : premières réunions

Les premières rencontres débuteront entre le 5 et le 7 mai.

Voir bulletin n°1.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.