

Phénologie

2-3 feuilles au maximum

Tordeuses

Début de vols

Typhlodrome

Présence sur les jeunes feuilles

Mildiou

Analyse du risque
Pas de maturité des œufs.

Rais'Alsace

programme

Point météo/Phénologie

La végétation a fortement profité de la douceur d'avant Pâques. Les parcelles les plus avancées sont au stade 3-4 feuilles étalées mais le débourrement est très hétérogène au sein d'une même parcelle. La fourchette s'étend du stade débourrement 5 feuilles étalées.

Les précipitations enregistrées depuis le débourrement représentent de très faibles volumes puisqu'il n'est tombé en moyenne que 3 à 7 mm au cours du weekend de Pâques. L'arrivée de ces quelques gouttes s'est vue accompagner par une baisse des températures et des giboulées (T moyenne lors de ce weekend < 10°C).

Le risque de précipitations pour la semaine est faible. La crainte concerne avant tout le risque de gel au vu des prévisions pour jeudi mais aussi pour la semaine prochaine. Il va falloir veiller à réduire ce risque en

limitant la stagnation de poches froides (fauche par exemple).

Tordeuses

Piégeage

Il n'y a pour le moment que des captures timides.

Analyse du risque

Ce ne sera qu'à la faveur de la hausse des températures que les captures pourraient être plus « régulières ».

Typhlodromes

Situation

Les auxiliaires sont présents dès la sortie des premières feuilles.

Analyse

Ils participent en toute discrétion à la régulation des phytophtes de l'acariose et de l'érinose.

Mildiou

Analyse du risque

Pour que le mildiou génère une première contamination, il faut réunir les paramètres suivants : maturité des œufs d'hiver, température moyenne

supérieure à 11°C, au minimum 1^{ère} feuille étalée et pluies significatives sur sol humide.

A ce jour, le suivi de la maturité des œufs d'hiver montre qu'elle n'est pas encore acquise, probablement de par les températures fraîches mais aussi de par la sécheresse globale des sols depuis l'automne.

Le risque mildiou est à ce jour nul, tant que les températures restent inférieures à 11°C, que les œufs ne sont pas murs et que les précipitations sont faibles.

Mesures prophylactiques

L'épamprage constitue une mesure prophylactique dans la mesure où les précipitations sont faibles. En 2016, les attaques de mildiou avaient touchées la plaine végétation sans passer par les pampres étant données les très fortes précipitations successives du mois de mai.

Rais'Alsace

Les premières réunions de bout de parcelles se tiendront **le mardi 9 mai**.

Un seul changement d'horaire pour cette année, concernant l'horaire de Furdenheim, avancé à 11h.

Ces rencontres sont toujours gratuites et permettent de discuter de l'état sanitaire, de l'entretien des sols...

Au programme :

- **Les lundis à 16h30 à Dahlenheim**, près de la carrière.
- **Les mardis dans le 67 :**
 - o 8h15 à **Scherwiller**, sur la route allant vers la Huhnelmühle,
 - o 9h15 à **Dambach la Ville**, au Buehlweg, sur la route allant à **Blienschwiller**,
 - o **10h15** sur la route **d'Andlau à Epfig** (Siebenweg),
 - o 11h30 à Rosheim, au-dessus du collège.
- Les mardis dans le 68 :
 - o 8h à **Saint Hippolyte**, piste cyclable avant l'entrée du village en venant de l'A35,
 - o 9h15 à **Kientzheim**, à l'entrée du village, au croisement direction Ammerschwahr,
 - o 9h30 à **Eguisheim**, sortie Herrlisheim sur la D83, direction Eguisheim sur la D1 bis,
 - o 10h30 à **Pfaffenheim**, rue de Pfaffenheim, entre Rouffach et Pfaffenheim, au croisement sous les noyers,
 - o 11h30 à **Orschwahr**, à proximité du stade.

- Les **mercredis** dans le 68 puis le **67 Nord** :

- o 8h à **Ribeauvillé**, route d'Ostheim, cabane en béton au niveau de l'aire de repos,
- o **11h** au croisement entre **Furdenheim** et Scharrachbergheim (même site que l'an passé).

Action pilotée par le ministère chargée de l'agriculture avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.