

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV
de la région
Occitanie



Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV
de la région
PACA



POIS CHICHE Héliothis : Risque moyen à fort. Bien que les piégeages moyens soient en baisse, on note toujours une activité du ravageur sur l'ensemble des zones. Vigilance à l'approche de la fin de cycle.

Ascochyte : Risque très faible. Soyez attentif si apparition de nouveaux symptômes.

POIS CHICHE

ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE ARC MEDITERRANEEN

Le réseau d'observation de la Surveillance Biologique du Territoire concernant le pois chiche sur l'Arc Méditerranéen (ex-régions Languedoc-Roussillon et région PACA) est mis en œuvre pour la campagne 2019. Ce bulletin est essentiellement centré sur le suivi du ravageur Héliothis. Le réseau se compose de 32 parcelles. Au cours des sept derniers jours, **14 parcelles** ont fait l'objet d'une observation.

• Stades phénologiques et état des cultures

Les stades sont homogènes dans le réseau, on retrouve des parcelles entre remplissage des graines et 50% à 90% des gousses mûres. L'ensemble des parcelles ont terminé leur floraison et se dirigent vers la maturité. Les moissons dans les parcelles les plus précoces sont en cours.

• Héliothis ou noctuelle de la tomate (*Helicoverpa armigera*)

Le suivi de ce ravageur est réalisé avec des pièges en végétation qui permettent de détecter la présence de papillons et suivre les vols. Pour 2019, 32 pièges sont déployés sur le territoire.



*Papillon d'H. armigera -
Ph Papillon d'H. armigera
- Photo FREDON
Aquitaine*




*Chenilles d'H. armigera
dans gousses de pois
chiche - Photo Terres
Inovia*

Le vol se poursuit dans le réseau, bien qu'il soit toujours en retrait vis-à-vis des semaines précédentes. On observe quelques dégâts dû aux larves sur gousses, à ce jour principalement à l'état de traces, dans les départements de l'Hérault, de la Drôme et du Vaucluse.


Comparaison annuelle de la dynamique d'observation du ravageur Héliothis

Nb moyen d'héliothis/ piège (avec valeurs nulles)
Suivis BSV pois chiche sur le réseau Arc Méditerranée




Suivi hebdomadaire de la pression Héliothis par classe d'individu piégé

Nb d'héliothis/ piège regroupé par classe
Suivis BSV pois chiche sur le réseau Arc Méditerranée



Parcelles observées du 2019-06-27 au 2019-07-03



HELIOTHIS PIEGE : ● [0 - 0] ●]0 - 5] ●]5 - 32]

Évaluation du risque : Risque moyen à fort, selon l'état d'avancement vers la fin de cycle. Bien que les piégeages moyens soient en baisse, on note toujours une activité du ravageur sur l'ensemble des zones. Vigilance dans les parcelles tardives.

● **Ascochytose (*Ascochyta rabiei*)**

Les températures très élevées des derniers jours ne sont plus favorables aux nouvelles contaminations. Attention toutefois dans les parcelles concernées par la maladie, il convient d'être prudent.

La période d'observation habituelle de la maladie se situe autour de la floraison. Les symptômes de l'ascochytose sont reconnaissables grâce aux nécroses avec cercles concentriques de pycnides sur feuilles, tiges et gousses (voir photo ci-contre). La maladie se conserve sur les résidus de culture et les semences.



Symptômes d'ascochytose sur feuilles
(photo Terres Inovia)

Évaluation du risque : Risque très faible. Soyez attentifs si apparition de nouveaux symptômes.

Surveillez vos parcelles, en observant feuilles, tiges et gousses.

Mesures prophylactiques :

La maladie se conserve sur les résidus de culture et les semences. L'utilisation de semences saines et la gestion des résidus de culture sont des mesures prophylactiques indispensables pour atténuer ou éviter la maladie. Pour être pleinement efficaces, ces actions doivent être mises en place à l'échelle du territoire.

• Mineuses

L'observation de symptômes sur feuilles est généralisée sur certains secteurs. La maturité, annoncée dans les toutes prochaines semaines, devrait diminuer la fréquence d'observation.

Dans les cas les plus graves, la pression des larves et des pontes entraîne de nombreuses galeries qui provoquent une défoliation rapide des tiges touchées. A ce jour, la nuisibilité du ravageur est mal connue en France. Il est très rarement nécessaire de protéger la culture vis-à-vis de ce nuisible.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé :

-pour la filière pois chiche par l'animateur filière de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations réalisées par : Les Chambres d'Agriculture de l'Aude, de l'Hérault, Ets Touchat, Terroir du Sud, Top Semence.

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. Les CRA d'Occitanie et de PACA dégagent donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.